

L3 MAPES — Topologie
2007-08
Feuille d'exercice no 3

1. On considère une isométrie u de \mathbf{R} , muni de sa distance usuelle, dans (\mathbf{R}^2, d_E) . Montrer que l'image de u est une droite. Qu'en est-il si on remplace d_E par la distance d_∞ définie par

$$d_\infty((x, y), (x', y')) = \max(|x' - x|, |y' - y|) ?$$

2. Montrer que $(C^0([0, 1]), d_\infty)$, l'espace des fonctions continues sur $[0, 1]$ muni de la distance sup, est complet.

3 *. Montrer que l_∞ est complet pour la distance sup d_∞ . *Indication* : On pourra utiliser le procédé diagonal vu en cours pour extraire une suite d'une suite de suites...

4 *. Soit (E, d) un espace métrique. On considère l'ensemble F des suites de Cauchy dans E , et la relation R sur F définie de la manière suivante : $(u_n)R(v_n)$ ssi la suite (w_n) définie par $w_{2n} = u_n$ et $w_{2n+1} = v_n$ est de Cauchy.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence sur F .

2. On note E' le quotient de F par R (l'ensemble des classes d'équivalence pour R dans F). Montrer qu'il existe une application naturelle injective u , qu'on précisera, de E dans E' , et que u est bijective ssi E est complet.

3. On suppose que $E = \mathbf{R} \setminus \{0\}$. Qu'est-ce que E' , quelle est l'image de u ?

4. Montrer que d définit une distance d' sur F , puis sur E' , telle que u est une isométrie de (E, d) dans (E', d') .

5. Montrer que (E', d') est complet.

6. Montrer que si $v : (E, d) \rightarrow (G, \delta)$ est une isométrie et si (G, δ) est complet alors il existe une isométrie $w : (E', d') \rightarrow (G, \delta)$ telle que $v = w \circ u$.

NB : (E', d') est le complété de (E, d) .

5. Soit (E, d) un espace métrique compact, soit $\epsilon > 0$.

1. Montrer qu'il existe un sous-ensemble fini F de E tel que tout point de E est à distance au plus ϵ de F .

2. Montrer qu'il existe un sous-ensemble fini F de E tel que

– tout point de E est à distance au plus ϵ de F ,

– deux points de F sont à distance au moins $\epsilon/2$.

6*. **A propos de la construction de \mathbf{R} .** On appelle \mathcal{R} l'ensemble des sous-ensembles $E \subset \mathbf{Q}$ majorés tels que $x \in E, y \leq x \Rightarrow y \in E$.

1. Montrer qu'il existe une injection naturelle $i : \mathbf{Q} \rightarrow \mathcal{R}$ qu'on précisera.

2. Montrer que \mathcal{R} est muni d'une relation d'ordre naturelle, dont la restriction à $i(\mathbf{Q})$ coïncide avec la relation d'ordre usuelle de \mathbf{Q} . Montrer que cette relation d'ordre est stricte.

3. Montrer que \mathcal{R} est muni d'une distance naturelle dont la restriction à $i(\mathbf{Q})$ coïncide avec la distance usuelle sur \mathbf{Q} .

4. Montrer que $i(\mathbf{Q})$ est dense dans \mathcal{R} pour la distance définie à la question précédente.

5. Montrer que \mathcal{R} a la propriété de la borne supérieure.

6. Montrer que \mathcal{R} peut être muni d'une structure de groupe, en définissant une addition dont la restriction à $i(\mathbf{Q})$ coïncide avec l'addition usuelle de \mathbf{Q} .

7. Montrer que \mathcal{R} est complet.